

LOTTI	Descrizione	Q.ta fabbisogno triennale	PREZZO OFFERTO A ML/GR	NOTE
6	Dieta liquida ipercalorica ed iperproteica ad elevata concentrazione di EPA E DHA, indicato per pazienti oncologici (con fibre e senza fibre). Distribuzione energetica: protidi 18 - 23 %, glicidi 41 - 63 %, lipidi 17 - 39%.	600.000 ML		
14	Dieta liquida ipercalorica (da 1,8 kcal/ml a 2 Kcal/ml) ed ipoproteica, indicata per pazienti nefropatici non dializzati. Distribuzione energetica: protidi 6 - 11 % glicidi 40 - 51% lipidi 43 - 49 %.	720.000 ML		
17	Dieta liquida ipercalorica (da 1,4-1,5 kcal/ml) arricchita in immunomodulanti con arginina e RNA, indicata per pazienti critici immunocompromessi. Distribuzione energetica: protidi 20 - 25 %, glicidi 50 - 55 %, lipidi 24 - 30 %.	300.000 ML		
18	Dieta liquida iperproteica (Prot. 20 - 25%) e ipercalorica (kcal 2,2 -3 kcal) indicato per pazienti che necessitano di ridurre l'apporto di liquidi (con fibre e senza fibre) sarcopenici, oncologici, scompensati.	480.000 ML		
19	Dieta enterale per svezzamento da NPT (ipocalorica 0,5 - 0,75 kcal /ml). Distribuzione energetica: protidi 16 - 27%, glicidi 43 - 49%, lipidi 30 - 35 %. Osmolarità < 260 mOsm/l.	900.000 ML		
20	Dieta enterale normocalorica (1 - 1,1 kcal /ml) senza fibre. Distribuzione energetica: protidi 15 -18 %, glicidi 49 - 55%, lipidi 28 - 33 %. Osmolarità < 270 mOsm/l.	2.250.000 ML		

22	Dieta enterale ipercalorica (1,5 - 1,6 kcal /ml) senza fibre. Distribuzione energetica: protidi 14 -19 %, glicidi 48 - 56%, lipidi 28 - 36 %. Osmolarità < 490 mOsm/l.	960.000 ML		
30	Dieta liquida ipercalorica (da 1,8 kcal/ml a 2 Kcal/ml) ed iperproteica, indicata per pazienti nefropatici dializzati. Distribuzione energetica: protidi 6-11% glicidi 40-51% lipidi 43-49%.	900.000 ML		
32	Dieta enterale normocalorica, per bambini da 1 anno di età. Senza fibre. Distribuzione energetica: protidi 10 - 13% glicidi 50 - 54% lipidi 34 - 40%. Osmolarità < 320 mOsm/l.	540.000 ML		
36	Alimento in polvere nutrizionalmente completo, senza fibre, a basso contenuto di grassi, poveri di LCT e ricchi di MCT, indicato in bambini e lattanti con disordini del sistema linfatico.	28.800 GR		
46	Formula liquida isocalorica (100 kcal/100 ml) a ridotto contenuto di proteine (contenuto di proteine <1.8/100 ml) indicata fin dalla nascita per il trattamento dietetico nei neonati con insufficienza renale	15.000 ML		
